

“やさしい大腸カメラ”の流れ(詳細)

検査 前日	準備	①健康保険証、②診察券、③検査費（3割負担で以下）をご準備ください。 観察±組織検査：約6,000～16,000円 ポリープ手術：約20,000～30,000円
	19時	・前日19時までに夕食を済ませてください。 ・夕食は消化の良い白い物（白米、うどん、白身魚、豆腐等）として下さい。
	21時	・前日21時にセンノシド2錠を内服してください。
検査 当日	6時	・朝食は抜いてください。 ・当日6時にプリンペラン2錠、モサプリド2錠を内服してください。
	6時30分	・モビプレップの内服を開始してください（内服方法は以下）。
	モビプレップ の内服方法	①モビプレップ1袋を水に溶かして、2Lの溶解液とします。
		②溶解液を1時間に1Lの速さで内服します。
		③1L内服後に、水を500ml飲みます。
		③の後でお通じが透明なら内服は終了。
		④ ③の後にお通じが透明でなければ、残りの溶解液を内服します。
	⑤ 追加内服でお通じが透明になれば終了し、水を500ml飲みます。	
	モビプレップ の注意点	※通常、モビプレップ内服開始からお通じが透明になるまで約3時間程度で、5-10回程度のお通じがありますが、個人差があります。
	10時～11時	・指定の予約時間にご来院頂きます。 ・お通じが透明でない場合、当院で追加内服頂くか浣腸を行う場合があります。 ※ご不明点があれば、お気軽に当院までお問い合わせください。 ・スタッフがお通じを確認後、検査着に着替えて点滴などの準備をします。
11時～12時	・準備が整ったら、スタッフが検査室にご案内します。	
	・検査は通常約15分ですが、ポリープがある場合は都度時間を頂戴します。	
	・切除すべきポリープはその場で切除します。切除に伴う痛みはありません。	
	・検査終了後、15-30分程度休んで頂き、問題なければ帰宅となります。 ・検査後、昼食は食べて頂けませんが消化の良い白い物（上記）として下さい。	